



Diagnostiek dementie Virtueel IET

- 1. Reden van verwijzing**
- 2. Medische voorgeschiedenis**
- 3. Anamnese**
- 4. Heteroanamnese**
- 5. Lichamelijk onderzoek**
- 6. Oriënterend neurologisch onderzoek**
- 7. Psychiatrisch onderzoek**
- 8. Bedside testen**
- 9. Lab onderzoek**
- 10. MRI**
- 11. NPO**
- 12. Conclusie**
- 13. Advies**

1. Reden van verwijzing

- Reden van verwijzing door huisarts
- Hulpvraag van patiënt
- Hulpvraag van familie

2. Medische voorgeschiedenis

- Inclusief episodelijst van huisarts

3. Anamnese (informatie direct van de patiënt)

- S
Hart/longklachten
valgeschiedenis, duizeligheid, hoofdpijn
slapen, eten, gewicht, toiletgang (mictie/def)

Medicatie (middelen, dosis, hulp bij bestellen en innemen, OTC medicatie)
Intoxicaties (roken, alcohol)
- F
(i)ADL, , zelfredzaamheid mobiliteit, autorijden, incontinentie
- M
globale biografie, geboortedatum en –plaats, gezinssamenstelling, opleidingen, beroep,
gehuwd wanneer, met wie, kinderen, daginvulling
- P
geheugenklachten klachten nu, evt ontstaan en beloop klachten.
huidige leeftijd, recent nieuwsfeit
plezier in het leven (evt. depressie vragen)
- C
Ogen, oren, spraak

4. Heteroanamnese, evt (gedeeltelijk) uit te besteden aan wijkverpleegkundige

- Tav ziektediagnostiek: (familie en thuiszorg of mantelzorger)
ontstaan en beloop van de klachten en stoornissen, eerdere problemen
tevens vragen naar probleemgedrag
autorijden
- tav zorgdiagnostiek (familie/mantelzorger/verzorgenden/thuiszorg)
- evt. tav persoonlijkheid
- IQ-Code (door mantelzorger laten invullen of afnemen door wijkvpk)
- NPI- Q bij probleemgedrag (niet standaard)

5. Lichamelijk onderzoek, evt achterwege laten als recent verricht door huisarts of als arts-patiënt relatie het niet toelaat

- Hydratietoestand
- Voedingstoestand
- perifere oedemen

- pols, bloeddruk, liggend en staand
- hart longen
- buik, mn blaas
- schildklier
- wonden
- visus,
- gehoor, cerumenproppen

6. Oriënterend neurologisch onderzoek

- oogbewegingen
- hemianopsie
- neglect
- extrapiramidale stoornissen
- krachtverschil (lateralisatie)
- pathologische reflexen en primitieve reflexen
- balans, lopen, staan, (schoenen)

7. Oriënterend psychiatrisch onderzoek

- Uiterlijk
- Contact
- Psychomotoriek
- Bewustzijn
- Aandacht
- Waarneming
- denken vorm
 - inhoud
- stemming
- affect
- angst
- persoonsindruk
- geschatte intelligentie
- copingstyle
- geheugen,
- oriëntatie tpp
- fasis, praxis, gnosis,
- ziektebesef
- ziekte-inzicht
- oordeel- en kritiecfunctiestoornissen

8. Bedsidetesten

- MMSE. Als recent MMSE is afgenomen, vervang dan appel/sleutel/tafel door boek/plant/molen
- Bijlage aanvulling bedside testen:
 - kloktekenen
 - cijfers goed: ja/ nee
 - wijzers goed: ja/ nee
 - spreekwoorden (abstractievermogen)
 - appel goed/fout
 - hoge bomen goed/fout
 - kalf goed/fout
 - taal
 - retrieval, herhaling 3 woorden MMSE einde vd test
 - herkenning (als cliënt geen woord heeft onthouden)
- Te overwegen valt het afnemen van een MOCA bij leereffect van de MMSE
- Bij vermoeden frontaal lijden: FAB

- Bij vermoeden depressie: GDS, MADRS of consultatie psycholoog.

9. Laboratoriumonderzoek

Standaard bloedonderzoek bestaat uit Hb, BSE, CRP, glucose, TSH en creatinine.

Op indicatie:

De vitamines B1, B6, B12, foliumzuur, natrium, kalium en calcium

Indicaties:

- gastro-intestinale comorbiditeit
- alcoholabusus
- diureticagebruik
- SSRI-gebruik
- een afwijkend voedingspatroon

10. MRI, zie apart protocol

11. NPO, zie apart protocol

12. Conclusie

- Ziekte diagnose
- Zorgdiagnose
- CDR bij actief autorijden

13. Behandel/begeleidingsadvies